



Övervakning av parasiter i fårbesättningar

Gårdsanpassad rådgivning baserad på systematiska träckprovsundersökningar

SYFTE

Syftet med övervakningssystemet är att få kunskap om parasitförekomst och eventuella problem i den egna djurhållningen. På så sätt kan man vidta åtgärder som på sikt minskar smittrycket och förebygger sjukdom hos djuren.

DELTAGANDE

Man deltar i övervakningssystemet genom att:

- Kontakta din besättningsveterinär eller SVA för planering och provtagning.
- Fylla i en remiss som laddas ner från webbsidan eller beställs från SVA.
- Första gången du deltar, fylla i ett frågeformulär som kan laddas ner från webbsidan.
- Skicka in en första omgång träckprov enligt anvisningar från upp till 9 individer. Pris, se nästa sida.
- Bokföra avmaskningstillfällen, preparat och betes användning.

Deltagandet fortsätter genom att träckprov skickas in 1-3 gånger årligen. Uppföljande provtagningar anpassas efter tidigare träckprovresultat och betesstrategier.

PROVTAGNING

Träckprov tas från upp till 9 individer. Materialet placeras i dubbla propåsar som försluts väl. Det bästa alternativet är att provta 9 djur individuellt (cirka 10 kulor per djur), märka och förpacka avföringen i separata plastpåsar och därefter skicka till laboratoriet för analys. På laboratoriet undersöks proven tre och tre genom samlingsanalyser.

Om det inte är möjligt att provta djuren individuellt tas cirka 10 kulor från tre olika högar och läggs i samma plastpåse. Totalt skickas tre sådana plastpåsar med samlingsprov till laboratoriet.



Antal provtagningstillfällen beror delvis på driftsform. Ekologiska besättningar behöver oftast provta mer frekvent än besättningar med konventionell driftsform. I konventionella besättningar provtas tackorna vanligen innan betessläpp och lammen efter en månads betesgång. Lämpliga provtagningstillfällen diskuteras och bestäms i samråd med veterinär eller SVA.

ANALYS AV PROV

Vid analys av träckprov utförs alltid en kvantitativ undersökning* som visar antalet ägg av mag-tarmparasiter och antalet oocystor (koccidier) per gram träck. Dessutom görs en kvalitativ undersökning genom odling för att fastställa om den stora löpmagsmasken (*Haemonchus contortus*) finns i besättningen.

Utöver dessa undersökningar kan vid behov extra undersökningar beställas, bland annat stora leverflundran (*Fasciola hepatica*) och lilla leverflundran (*Dicrocoelium dendriticum*) och små lungmaskar (*Protostrongylus* sp och *Muellerius* sp). För extra undersökningar behövs mer träck. Skicka helst dubbel mängd.

*ackrediterad metod

BEDÖMNING AV RESULTAT

Resultaten bedöms av SVA:s veterinärer och diskuteras per telefon med besättningsveterinär eller annan kontaktperson för gården. Förslag till åtgärder lämnas med hänsyn till resultat och vad som meddelats om aktuella förutsättningar och rutiner på gården.

OBSERVERA!

Träckprov från får i övervakningssystemet måste alltid skickas med remiss "Övervakning av parasiter i fårbesättningar". Denna kan laddas ner från www.sva.se eller rekvireras från SVA.

PRISER 2010

	Exkl. moms	Inkl. moms
Tre samlingsprov med upp till tre individer i varje	750 kr	937,50 kr
Extra undersökningar		
Stora leverflundran	300 kr	375 kr
Sedimentation	255 kr	318,75 kr