

## Provtagningsinstruktion *Brucella canis*

---

**OBS! Vid klinisk misstanke, kontakta alltid SVA innan inskickande av prov!**

Provet måste komma in till laboratoriet under ordinarie öppettider.

Observera att om hela organ eller foster skickas in ska dessa adresseras till/märkas Avdelningen för Patologi och Viltsjukdomar, för uttagning av prov. Avgift för detta tillkommer.

**Observera att *B. canis* kan infektera människor. Iaktta försiktighet vid hantering av misstänkt infekterad hund och provmaterial.**

### Inför provtagningen:

Förslag på material som kan behövas:

- ✓ e-svabbar
- ✓ blododlingsflaskor för aerob odling. För BactAlert gäller upp till 10 ml blod/flaska (pediatrisk flaska upp till 4 ml)
- ✓ burk för urinprov
- ✓ blodrör för serum

Provtagningsmaterial inklusive blododlingsflaskor kan beställas från SVA.

### Anamnesupptagning/ klinisk undersökning:

- Var extra uppmärksam på onormala fynd vid undersökning av reproduktionsorgan samt tecken på uveit och/eller diskospondylit
- Om hunden behandlats med antibiotika skall detta anges med preparat och datum för behandlingen
- För tik anges var i löpcykeln hon befinner sig. Vid abort anges dräktighetsvecka
- Utlandskontakt?
- Kontrollera och notera identitetsmärkning

### Provtagningen (märk alla prover med djurets namn eller ID-nummer)

**Tik vid abort (prov tas så snabbt som möjligt efter abort och helst ej senare än tre veckor efter abort):**

- Fosterhinnor, moderkaka, foster och vaginalflytningar
- Vaginalprov (sekret)
- Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
- Blod i aerob blododlingsflaska

**Tik, ej abort (provet tas med fördel under löp):**

- Vävnad från förändrade organ (t ex aspirat från lumbarabscess)
- Vaginalprov (sekret)
- Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
- Blod i aerob blododlingsflaska

**Provtagning för intakt hanhund**

- Vävnad från förändrade organ (t ex testikel, aspirat från lumbarabscess)
- Ejakulat för odling och för kontroll av motilitet/morfologi, (utförs och bedöms på plats av provtagande veterinär)
- Preputialsvabb
- Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
- Blod i aerob blododlingsflaska

**Provtagning för kastrerad hanhund och valp/unghund**

- Vävnad från förändrade organ (tex testikel, aspirat från lumbarabscess)
- Preputialsvabb
- Spontankastat urinprov
- Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
- Blod i aerob blododlingsflaska

**Efter provtagningen**

Provmaterial för odling skall hållas kylt, helst vid + 5 C° (+/- 3 C°). Om transporten beräknas ta mer än 24 timmar skall materialet frysas och skickas in fryst ≤ -16 C eller med kylklampar. Det gäller dock ej blododlingsflaskor eller vaginalsvabbar!

Det är viktigt att prover för odling transporteras till SVA så snabbt som möjligt efter att de har tagits. Tänk på att provet måste komma in till laboratoriet under ordinarie öppettider.

**Märk** paket innehållande odlingsprover med texten ”Epiz-BKT”. Om hela organ eller foster skickas in ska dessa adresseras till Avdelningen för Patologi och Viltsjukdomar, för uttagning av prov. Paketet ska då märkas med texten ”Epiz-POV”.

Vid inskickande av prov med klinisk misstanke, packa serum, flaskor, prov för odling och remiss separat. I ärenden som rör smittspårning beställd av Jordbruksverket anges Jordbruksverkets diarienummer på remissen.

Se [Skicka in prover och djurkroppar - SVA](#) för instruktioner om paketering för inskickande av prov.

**Viktigt att ange på remissen:**

- Djurägare
- Insändare
- Brucella canis-utredning

*I de fall ett överordnat uppdrag finns skall det anges (t ex vid smittspårningsarbete). Ange eventuellt diarienummer Jordbruksverket.*

- Djurets namn, chipnummer samt helst registreringsnummer
- Eventuella fynd vad gäller anamnes och klinisk undersökning, spermabedömning och antibiotikabehandling
- Vilket provtagningstillfälle i ordningen det är (första, andra...)

Frågor som rör diagnostiken hänvisas till veterinär på MIK, avdelningen för mikrobiologi.

Provtagningsmaterial inklusive blododlingsflaskor kan beställas från SVA via SVA:s växel 018-67 40 00.

## **AGENS OCH ANMÄLNINGSPLIKT**

Brucellabakterier är små gramnegativa, kockoida stavar. Flera olika arter, som infekterar olika djurslag finns. Hund infekteras oftast av *B. canis*, även om *B. abortus* och *B. suis* sporadiskt har isolerats vid aborter hos hund i de länder där dessa infektioner förekommer.

Till skillnad från brucellos hos livsmedelsproducerande djur (idisslare och svin) lyder brucellos hos hund inte under epizootilagen. Brucellos hos hund är dock en anmälningspliktig diagnos. På grund av sjukdomens allvarliga karaktär kan Jordbruksverket välja att vidta bekämpningsåtgärder om sjukdomen skulle påvisas i Sverige.

## **SEROLOGISK UNDERSÖKNING**

Antikroppstester är ofta negativa upp till fyra veckor efter infektionstillfället och först åtta till tolv veckor efter infektion kan man räkna med ett mätbart serologiskt svar hos ett infekterat djur. Antikropparna försvinner sedan när bakteriemin försvinner även om bakterierna fortfarande återfinns i olika vävnader i djuret. Låga antikroppsmängder kan också föreligga vid kronisk infektion, tika provtas därför företrädesvis under löpning, dräktighet eller i samband med en abort, då sannolikheten för påvisande av positiv antikroppstitär är högre. Antibiotikabehandling kan leda till falskt negativa provresultat. I vissa fall kan resultatet av analysen vara tvetydigt och då rekommenderas att ett omprov tas inom fyra till tolv veckor. Positiva prover bör dock även konfirmeras genom påvisande av bakterien. Provtagning skall ske minst två gånger med fyra till sex veckors mellanrum om bakterien ej kan påvisas vid första försöket. Vid smittspårning gäller således att upprepade provtagningar behövs innan man kan utesluta smitta. Serologisk undersökning efterfrågas av en del länder som rutin i samband med export/import.

## **ODLING**

Definitiv diagnos ställs genom isolering av bakterien *B. canis* från hunden. Specifik frågeställning krävs. Odling av *Brucella* sker på säkerhetslaboratorium för smittfarligt material på grund av smittrisen för laboratoriepersonalen. Direktutstryk görs på insänt material och avläses samma dag eller närmast efterkommande vardag. Själva odlingen tar mellan en och fyra veckor. Odlingen utförs på specialmedium. *B. canis* utsöndras intermittent och ett negativt odlingsresultat utesluter inte att en hund är infekterad. Antibiotikabehandling kan bidra till ett falskt negativt resultat.

### **Provmaterial:**

*B. canis* framodlas företrädesvis från aborterade foster, moderkaka och vaginalflytningar i samband med aborter. Sperma eller urin används för odling från misstänkt infekterade hanhundar. Blododling skall alltid göras vid misstanke om brucellos. Det går även att odla från t.ex organmaterial eller aspirat från ryggläsioner, lymfknutor, prostata, bitestikel och mjälte. Observera zoonosrisken vid insamlande och paketerande av material.