

Fängsling av ben för att undersöka och behandla klöv utan verkstol

För att undersöka och behandla en klövsjukdom i mjukvävnad och klövspalt behöver foten immobiliseras. Allra bäst görs detta med en modern hydraulisk verkstol men enklare varianter kan också fungera bra. Är kon lugn (vill ej resa sig) kan man göra undersökning och bandagering på liggande ko. En hasbrems kan också anläggas. Saknas verkstol kan man på stående ko lyfta upp och fixera foten med ett rep, vilket går till på följande sätt.

- Ställ/bind kon i en trång spilta så hon inte kan röra sig framåt eller åt sidorna. Det kan vara tex i mjölkgrupens uppställning eller en båspall med båsavskiljare där huvud låses fast eller en gång med sidogrindar. Det går också att jobba i ett liggbås men det måste finnas ett rör eller fästianordning för ett rep rakt ovanför bakre ändan av kon (svansen).
- Ett rep ca 3-4 m långt läggs över röret och den ena änden binds med en löpsnara (dubbelt halvslog om egen part eller löpögla) runt hasen (akillesenan) och dras åt. Ju hårdare man drar denna snara ju bättre blir brämseffekten.
- Lyft nu hasen och benet genom att samtidigt dra i repet. Sträck repet och ta den andra änden runt hasen och upp över röret ännu ett varv. Om kon reflexmässigt sparkar så fortsätt att dra så blir rörelseutrymmet mindre att sparka. Lyft tills hasspetsen kommer i jämnhöjd med höften och fäst repet runt snaran ovanför hasen med en säkerhetsknut som lätt går att släppa. Stå aldrig rakt bakom kon utan vid sidan som på bild (kick, gödselsprut).
- Med denna metod blir hasen brämsad samtidigt som den blir upplyft och man jobbar lätt i samma ställning som när man lyfter en hov dvs med hoven/klöven i famnen. Denna metod att lyfta kan också användas i äldre verkstolar om det inte finns vinsch baktill. Framfot kan lyftas med rep som man lägger över ryggen och fäster i motsatta frambenets armveck.

