

PAR Provtagningsinstruktion: träckprov höns

TRÄCKPROV FRÅN VÄRPHÖNS/AVELSHÖNS

Provtagning från gödselmattor:

- Kör mattorna dagen före provtagning för att få bort gammal gödsel.
- Ta prov på minst två ställen, exempelvis vid början och slutet av bandet, på minst två olika gödselband för att få ett samlingsprov som är representativt för hela avdelningen.
- Lägg träckproverna (minst 4 dl) i en ren behållare.
- Blanda noggrant.
- Ta sedan ut ett prov på ca 1 dl träck som skickas för analys.

Om gödselmattor saknas i stallet:

- Samla färskt träck från minst fyra platser i hönshuset. Samla träck från inredningen, exempelvis sittpinnar och våningsplan, inte från ströbädden. Varje prov ska bestå av minst 1 dl träck.
- Lägg träck i en ren behållare.
- Blanda noggrant.
- Ta sedan ut ett prov på ca 1 dl träck som skickas för analys.

Fyll i remissen. OBS! En remiss per provtagen avdelning/djurutrymme. Skicka prov och remiss i vadderat kuvert eller paket till SVA.

TRÄCKPROV FRÅN UNGHÖNS

- Proverna tas från gödselmattor eller inredning på samma sätt som för värphöns och avelshöns men proverna ska INTE blandas. De fyra proverna läggs i SEPARATA behållare/plastpåsar.

Fyll i remissen. OBS! En remiss per provtagen avdelning/djurutrymme. Skicka prover och remiss i vadderat kuvert eller i paket till SVA. På laboratoriet analyseras de fyra samlingsproven separat (totalt 4 analyser).