

Klövbandage med kompress och lokal behandling

- För att få bästa effekt av en lokal klövbehandling behöver huden först rengöras om foten är gödselbemängd. Bäst om ballar och klövspalt borstas med tvål och varmt vatten. Är det löst sittande gödselblandning kan det räcka att spola av.
- Salicylsyra i pulverform, läggs torrt direkt på sårområdet ca 2 matskedar (se bild). Pulvret tar åt sig fukt under bandaget och ger en bra beredning.
- Använd en kompress, bomull eller trosskydd för att hålla medlet bättre på plats och fördela tryck (se bild).
- Veträp eller motsvarande typ av bandage får inte dras åt för hårt så att det blir en stringtrosa. I stället ska bandage snarare vara som en sumobyxa eller blöja. Lagg första bandageslingan från fotens framsida genom klövspalt avsluta på samma sätt med att fästa änden under bandage i karled (se bilder).
- Bandage tas bort efter 3 dagar och fot kontrolleras. Om det anses befogat kan bandage kan läggas om ytterligare en omgång och då noteras i protokoll.



Bild 1. Lagg ca 2 matskedar salicylsyrepulver på en kompress, trosskydd, kompress eller motsvarande för att fördela tryck i klövspalten. (Samma typ av bandage kan läggas vid limax 7-10 dagar och digital dermatit 3 dagar.)



Bild 2. Påbörja och avsluta bandage med en slinga genom klövspalten och dra inte åt för hårt.

